


les jeunes prépuces


Le prépuce c'est quoi ? : c'est le repli de peau qui recouvre le gland



Le décalottage : c'est l'action de replier le prépuce (le petit bout de peau) jusqu'à la base du gland.

Chez les petits enfants en dessous de 6 ans, il est tout à fait normal de ne pas pouvoir décalotter complètement (96% des enfants) à cause :


- de possibles adhérences
- d'un phimosis
- d'un frein trop court



Avant 6 ans, le décalottage n'est pas indispensable, ne surtout pas forcer !

Le phimosis : c'est quand le bout du prépuce est trop serré, l'anneau d'ouverture est trop petit. Il est physiologique (normal) chez le petit enfant : 80% à 6 mois - 50% à 1 an - 10% à 3 ans - 8% à 6 ans.

Les adhérences : c'est quand le prépuce est collé au gland. Elles sont NORMALES ! Elles partent dans l'enfance avec la sécrétion de smegma (petite substance blanchâtre). Elles empêchent le passage de l'urine sous la peau, mais ne gênent pas à la miction.



Le frein : c'est un bout de peau qui relie le prépuce à la face inférieure du gland. S'il est trop court il peut gêner au décalottage et lors de la sexualité.

Après 6 ans, l'enfant peut se décalotter en douceur pour son hygiène intime.

Pour toute question, n'hésitez pas à en parler à votre médecin traitant. Retrouvez toutes nos actions sur le site de la MSP : www.msp-enosis.fr

Vidéo explicative : <https://www.whydok.fr/prepuce-whydoc-29/>

